

Botox Patientenleitfaden

Vorher - Behandlungstag - Nachsorge

Allgemeines Informationsdokument - ersetzt keine persönliche ärztliche Beurteilung.



Dr. Hamza Gemici

Arzt für medizinische Ästhetik - Ataşehir, Istanbul

Auf Patientensicherheit ausgerichtete nicht-chirurgische ästhetische Medizin

Juni 2026 – Deutsch

Inhalt

Abschnitte

- **03. So verwenden Sie dieses Handbuch**
Start
- **04. Botox / Botulinumtoxin auf einen Blick**
Zusammenfassung
- **05. Was es kann und was nicht**
Grenzwerte
- **06. Wer könnte ein besserer Kandidat sein?**
Eignung
- **07. Wann sollte mit der Behandlung gewartet werden?**
Verschieben
- **08. Was sollte zuerst geklärt werden?**
Beratung
- **09. Vorbereitung 4-2 Wochen vorher**
4-2 Wochen
- **10. Letzte 48 Stunden und Morgen der Behandlung**
Letzte 48 Stunden
- **11. Ablauf des Verfahrenstages**
Eingriffstag
- **12. Wie fühlt es sich an?**
Komfort
- **13. Was ist unmittelbar danach normal?**
Erste Stunden
- **14. Nachsorge in der ersten Woche**
Erste Woche
- **15. Wann werden die Ergebnisse ausgewertet?**
Ergebnisse
- **16. Medikamente, Infektionen und besondere Risiken**
Medikamente
- **17. Warnschilder**
Warnschilder
- **18. Foto- und Follow-up-Richtlinie**
Foto und Follow-up
- **19. Druckbare Patientencheckliste**
Druckbare Checkliste
- **20. Quellen und Klinikkontakt**
Quellen

So verwenden Sie dieses Handbuch

Bereiten Sie sich auf die Beratung vor und stellen Sie sicherere Fragen.

Start

Dieser Leitfaden hilft Patienten, die eine Behandlung mit Botulinumtoxin in Betracht ziehen, dabei zu verstehen, wie sie sich vorbereiten, am Tag des Eingriffs behandelt werden, nach der Behandlung vorgehen und die Symptome verstehen, die einen sofortigen Kontakt auslösen sollten.

Klinisch wichtige Punkte

- Die Informationen dienen der Aufklärung und ersetzen nicht die persönliche medizinische Entscheidungsfindung.
- Bringen Sie Medikamente, Erkrankungen, Allergien, frühere ästhetische Eingriffe und Erwartungen mit.
- Das Ziel ist kein Ergebnisversprechen; Es ist eine klarere Eignungs-, Risiko- und Nachsorgeplanung.
- Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an die Klinik, anstatt sich auf Kommentare in den sozialen Medien zu verlassen.

Beste Verwendung

Lesen Sie vor der Konsultation den vollständigen Leitfaden, markieren Sie relevante Risikopunkte und stellen Sie diese Fragen direkt.

Botox / Botulinumtoxin auf einen Blick

Kurze Definition, realistisches Ziel und wichtige Grenzen.

Zusammenfassung

Botox / Botulinumtoxin ist ein medizinisch-ästhetisches Verfahren, das für Muskelaktivität, dynamische Linien, ausgewählte Gesichtsbalancierung und Masseter-/Bruxismus-Ziele in Betracht gezogen wird. Der Plan basiert auf einer persönlichen Beurteilung und einer individuellen Risikobewertung.

Entscheidungstabelle

Ziel Gemessene Entspannung für dynamische Falten, Mimik-Muskelaktivität und ausgewählte muskelbezogene ästhetische oder funktionelle Ziele.

Kein Ziel Füllerähnliches Volumen, alleinige Korrektur der Hautqualität oder das Versprechen, alle Gesichtsbewegungen einzufrieren.

Timing Die anfängliche Wirkung tritt oft über Tage hinweg auf; klarere Überprüfung nach ca. 10–14 Tagen; Die Dauer verblasst individuell über Monate

Kernprinzip Mehr Behandlungsaufwand bedeutet nicht ein besseres Ergebnis; Die richtige Indikation steht an erster Stelle.

Klinisch wichtige Punkte

- Die richtige Eignung ist wichtiger als ein Produkt- oder Gerätenamen.
- Die Auswirkungen variieren je nach Patient; Gewebe, Alter, Lebensstil und Krankengeschichte sind von Bedeutung.
- Der gleiche Eingriff wird nicht für jeden Patienten identisch geplant.
- Die Behandlung sollte einer Untersuchung, einer Einverständniserklärung und einem Nachsorgeplan folgen.

Kernentscheidungssatz

Fragen Sie: „Ist meine Erwartung mit Botox / Botulinumtoxin realistisch?“

Was es kann und was nicht

Grenzen zu kennen ist Teil der Patientensicherheit.

Grenzwerte

Botox / Botulinumtoxin kann für ausgewählte Ziele die richtige Option sein, ist aber nicht die Antwort auf jedes ästhetische Anliegen. Klare Grenzwerte reduzieren unnötige Behandlungsrisiken.

Entscheidungstabelle

Besser geeignetes Ziel Gemessene Entspannung für dynamische Falten, Mimik-Muskelaktivität und ausgewählte muskelbezogene ästhetische oder funktionelle Ziele.

Unrealistische Erwartung Füllerähnliches Volumen, alleinige Korrektur der Hautqualität oder das Versprechen, alle Gesichtsbewegungen einzufrieren.

Möglicherweise ist eine Kombination erforderlich Volumen, Muskelaktivität, Hautqualität, Pigmentierung oder Schläffigkeit können andere Pläne erfordern.

Klinisch wichtige Punkte

- Ausgangsanatomie und Gewebequalität haben großen Einfluss auf das Ergebnis.
- Gefilterte Fotos oder das Ergebnis eines anderen Patienten sollten Ihr Ziel nicht definieren.
- Es ist nicht zu erwarten, dass ein Eingriff alle Gesichts- oder Hautprobleme löst.
- Eine Verschiebung oder eine andere Empfehlung kann nach ärztlichem Ermessen erfolgen.

Erwartungsprüfung

Wählen Sie vor der Beratung ein Hauptanliegen aus. Wenn das Hauptziel unklar ist, wird der Plan unklar sein.

Wer könnte ein besserer Kandidat sein?

Die Eignung hängt von der Prüfung ab, nicht nur vom Alter.

Eignung

Patienten mit dynamischen Linien oder Problemen bei der Muskelaktivität, die eine natürliche Ausdruckserhaltung wünschen und die Botulinumtoxin-Grenzwerte verstehen, könnten die besseren Kandidaten sein.

Entscheidungstabelle

Besseres Profil Patienten mit dynamischen Linien oder Problemen bei der Muskelaktivität, die eine natürliche Ausdruckserhaltung wünschen und die

Vorsichtigeres Profil Hohe Empfindlichkeit, aktive Hauterkrankung, unkontrollierte Erkrankung oder Druck durch ein Großereignis.

Bewertungsregel Fotos können bei der Triage hilfreich sein; Die Eignung erfordert eine persönliche ärztliche Beurteilung.

Klinisch wichtige Punkte

- Erwartungen sollten natürlich und maßvoll sein.
- Eine aktive Infektion, eine unkontrollierte Erkrankung oder unrealistische Ziele können die Behandlung verzögern.
- Vorherige Eingriffe und Komplikationshistorie sollten nicht ausgeblendet werden.
- Eine barrierefreie Nachsorge ist Teil der Behandlungssicherheit.

Beratungsvorbereitung

Bringen Sie zum Termin Ihr Hauptanliegen, den Zeitpunkt der Behandlung und eventuelle frühere Komplikationen mit.

Wann sollte mit der Behandlung gewartet werden?

Manchmal ist es die sicherere medizinische Entscheidung, heute nicht zu behandeln.

Verschieben

Botox / Botulinumtoxin kann bei aktiver Infektion, offenen Wunden, unkontrollierter Erkrankung, Schwangerschaft/Stillzeit oder neuen Problemen im Behandlungsbereich verschoben werden. Neuromuskuläre Erkrankungen, Schluck-/Atmungsanamnese, aktive Infektion, Schwangerschaft/Stillzeit und bestimmte Medikamente bedürfen einer besonderen Untersuchung.

Entscheidungstabelle

Heute verschieben	Fieber, aktive Infektion, offene Wunde, Fieberbläschen, deutliche Reizung oder Unwohlsein.
Neuplanung mit Arzt	Schwangerschaft/Stillzeit, Antikoagulanzen, Immunsuppression, Implantate oder kürzliche Operation.
Betrachten Sie eine andere Route	Erwartungen außerhalb des Verfahrensumfangs, starker äußerer Druck oder Bedarf an einer anderen Spezialisierung.

Klinisch wichtige Punkte

- Melden Sie vor der Ankunft Fieber, aktives Herpesbläschen, Hautinfektion oder offene Wunde.
- Geben Sie Blutverdünner, immunsuppressive Behandlung und eine Vorgeschichte schwerwiegender Allergien an.
- Kürzlich durchgeführte zahnärztliche Eingriffe, Operationen oder andere ästhetische Eingriffe können das Timing verändern.
- Eine Verschiebung ist eine Sicherheitsentscheidung, kein Fehler.

Dringende Warnung

Suchen Sie bei Atembeschwerden, weit verbreiteten allergischen Reaktionen, neurologischen Symptomen, Sehstörungen oder sich schnell verschlimmernden Infektionen einen Notarzt auf.

Sicherheitsregel

Das Erscheinen zu einem Termin bedeutet nicht, dass die Behandlung fortgesetzt werden muss. Der abschließende Sicherheitscheck schützt Sie.

Was sollte zuerst geklärt werden?

Ein guter Plan ist vor der Behandlung verständlich.

Beratung

Die Konsultation sollte Erwartungen, Krankengeschichte, Medikamente, Allergien, frühere Eingriffe, Fotografie, Risiken, Alternativen und Nachsorgeplanung umfassen.

Entscheidungstabelle

Patientenfreigaben

Erwartungen, vorherige Eingriffe, Medikamente, Erkrankungen, Reise- und Veranstaltungstermine.

Arzt beurteilt

Eignung, Risiken, Alternativen, Behandlungsgrenzen und Nachsorgeplan.

Gemeinsame Entscheidung

Behandlung, Verschiebung, Kombinationsplan oder Überweisung.

Konsultationshinweis

Wenn der Plan nicht klar ist, müssen Sie sich nicht noch am selben Tag entscheiden. Bitte um Erklärung.

Vorbereitung 4-2 Wochen vorher

Planen Sie ruhig und vorhersehbar.

4-2 Wochen

Die Wochen vor der Behandlung sollen die Haut und den allgemeinen Gesundheitszustand stabil halten, unerwartete Medikamenten- oder Verfahrensänderungen reduzieren und den Zugang zur Nachsorge klären.

Klinisch wichtige Punkte

- Beginnen Sie nicht mit starken neuen Hautpflegeprodukten oder aggressiven Heimbehandlungen.
- Sonnenbrand, Infektion oder Reizung melden.
- Teilen Sie Daten anderer ästhetischer Eingriffe mit.
- Vermeiden Sie die Planung unmittelbar vor größeren Ereignissen.

Planungshinweis

Lassen Sie bei der Erstbehandlung einen angemessenen Puffer vor wichtigen Ereignissen.

Letzte 48 Stunden und Morgen der Behandlung

Einfache Vorbereitung verbessert die Nachbereitung.

Letzte 48 Stunden

In den letzten beiden Tagen geht es um die Beruhigung der Haut, eine klare Gesundheitskommunikation und die Vermeidung eines überstürzten Behandlungstages.

Entscheidungstabelle

Do	Einfache Pflege, ausreichend Schlaf, offene Kommunikation.
Vermeiden	Neue Wirkstoffe, intensive Sonne, Alkohol/Erschöpfung und selbstständiges Absetzen von Medikamenten.
-Bericht	Fieber, Fieberbläschen, Infektion, neue Medikamente, zahnärztliche Behandlung oder Hautreaktion.

Endkontrolle

Wenn Sie sich am Behandlungsmorgen unwohl fühlen, wenden Sie sich vor Ihrer Ankunft an die Klinik.

Ablauf des Verfahrenstages

Identität, Einwilligung, Plan, Behandlungsschritte und Aufklärung über die Nachsorge.

Eingriffstag

-Verfahrens für Botox/Botulinumtoxin umfasst ein kurzes Gesundheitsupdate, eine Überprüfung des Bereichs, bei Bedarf Fotografie/Markierung, eine Einverständniserklärung, Behandlungsschritte und Anweisungen zur Nachsorge.

Klinisch wichtige Punkte

- Der Plan kann sich aus Sicherheits- oder Komfortgründen ändern.
- Melden Sie Schmerzen, Brennen, Schwindel oder andere ungewöhnliche Symptome während der Behandlung.
- Vor dem Verlassen der Klinik sollten normale Symptome und Warnzeichen klar erkennbar sein.
- Die Nachverfolgung und der Kontaktweg sollten klar verstanden werden.

Während des Verfahrens

Versuchen Sie nicht, Ausdauer zu beweisen; Melden Sie sofort ein unkontrollierbares Gefühl.

Wie fühlt es sich an?

Eine Behandlung ganz ohne Empfindung ist nicht zu erwarten; der Komfort sollte gut steuerbar bleiben.

Komfort

Botulinumtoxin-Injektionen können sich wie kurze Nadelstiche und leichtes Stechen anfühlen; Die Behandlung ist in der Regel von kurzer Dauer, der Komfort variiert jedoch je nach Person und Region.

Entscheidungstabelle

Kann erwartet werden Botulinumtoxin-Injektionen können sich wie kurze Nadelstiche und leichtes Stechen anfühlen; Die Behandlung ist in der Regel von kurzer Dauer, der

Melden Sie sich sofort Scharfer, zunehmender, unkontrollierbarer Schmerz; Verbrennung; Schwindel; Seh- oder Atembeschwerden.

Falsches Ziel Mehr Beschwerden bedeuten nicht unbedingt ein besseres Ergebnis.

Klinisch wichtige Punkte

- Die Empfindlichkeit variiert je nach Patient und Region.
- Offene Kommunikation verbessert Komfort und Sicherheit.
- Starke oder zunehmende Schmerzen sollten nicht als normal akzeptiert werden.
- Schmerzen oder Überempfindlichkeit nach dem Eingriff sollten im Allgemeinen abnehmen.

Komfortskala

Bewerten Sie das Gefühl auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn es nicht mehr beherrschbar wird, informieren Sie sofort den Arzt.

Was ist unmittelbar danach normal?

Der erste Auftritt ist nicht das Endergebnis.

Erste Stunden

Es können leichte Rötungen, punktförmige Schwellungen, leichte Schmerzen oder gelegentlich Blutergüsse auftreten. Die Wirkung ist nicht am selben Tag vollständig.

Entscheidungstabelle

Beobachten Sie zu Hause Leichte, sich verbessernde Symptome, die den allgemeinen Gesundheitszustand nicht beeinträchtigen.

Rufen Sie die Klinik an Zunehmender Schmerz, deutliche Schwellung, Farbveränderung, Verschlechterung oder unerwartete Asymmetrie.

Notfallversorgung Schluckbeschwerden, Atembeschwerden, allgemeine Muskelschwäche, Sprachveränderungen, Doppelsehen oder schwere allergische Reaktion

Klinisch wichtige Punkte

- Belasten Sie die behandelte Stelle am ersten Tag nicht.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze, intensive körperliche Betätigung und unnötige Massagen.
- Fügen Sie keine starken Produkte oder Medikamente hinzu, es sei denn, dies wird empfohlen.
- Wenn sich ein Symptom verschlimmert, gehen Sie nicht davon aus, dass es normal ist.

Dringende Warnung

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn bei Ihnen Schluckbeschwerden, Atembeschwerden, allgemeine Muskelschwäche, Sprachveränderungen, Doppelbilder oder schwere allergische Reaktionen auftreten.

Plan für den gleichen Tag

Fotografieren Sie unerwartete Symptome bei gleichmäßigem Licht und notieren Sie Startzeit und Schweregrad.

Nachsorge in der ersten Woche

Richtige Pflege ist besser als übertriebene Eingriffe.

Erste Woche

Die erste Woche konzentriert sich darauf, den behandelten Bereich ruhig zu halten, zu bestätigen, dass sich die Symptome bessern, und frühzeitig über Veränderungen zu berichten.

Entscheidungstabelle

0-24 Stunden

Beruhigende Pflege und Vermeidung übermäßiger Hitze.

2-3 Tage

Schmerzen oder Empfindlichkeit sollten nachlassen; Es wird von einer Verschlechterung berichtet.

1 Woche

Die Gegend sollte ruhiger sein; Aktive Hautpflege kehrt nach persönlichem Plan zurück.

Folgehinweis

Führen Sie ein Symptomprotokoll: Startzeit, Bereich, Schweregrad, Trend und damit verbundene Symptome.

Wann werden die Ergebnisse ausgewertet?

Der frühe Eindruck und das reife Ergebnis sind unterschiedlich.

Ergebnisse

Botulinumtoxin Wirkung beginnt allmählich. Eine frühzeitige Beurteilung kann irreführend sein; Symmetrie, Ausdruck und Dosiswirkung werden in der Regel nach etwa 10–14 Tagen aussagekräftiger überprüft.

Klinisch wichtige Punkte

- Verwenden Sie für den Fotovergleich das gleiche Licht und den gleichen Winkel.
- Gewichtsveränderung, Schlaf, Sonne, Rauchen und Hautpflege können das Aussehen beeinflussen.
- Eine frühzeitige Verbesserung ist nicht endgültig; Eine frühe subtile Veränderung ist kein automatischer Misserfolg.
- Eine wiederholte Behandlung sollte von der Beurteilung und dem Ansprechen abhängen, nicht nur von einem Kalender.
- Die Nachsorge sollte standardisierte Fotos, Untersuchungsbefunde und das ursprüngliche Behandlungsziel kombinieren.

Richtige Einschätzung

Beurteilen Sie die Ergebnisse anhand des ursprünglichen Ziels, der Nachuntersuchung und standardisierter Fotos, nicht anhand eines Selfies aus anderen Lichtverhältnissen.

Medikamente, Infektionen und besondere Risiken

Kleine Details können den Plan ändern.

Medikamente

Neuromuskuläre Erkrankungen, bestimmte Medikamente wie Aminoglykoside, Blutverdünner, Schwangerschaft/Stillen, frühere Toxinreaktionen und die Echtheit des Produkts sind von Bedeutung.

Entscheidungstabelle

Neuromuskuläre Erkrankung

Muskelerkrankungen, Schluck- oder Atemanamnese erfordern eine besondere Untersuchung.

Medikamenteninteraktion

Einige Antibiotika und Medikamente, die die neuromuskuläre Übertragung beeinflussen, können die Planung verändern.

Blutverdünner

Kontext der Blutergüsse wird besprochen; Medikamente werden nicht ohne Genehmigung abgesetzt.

Produkteinheiten

Botulinumtoxin Produkteinheiten sind nicht austauschbar.

Klinisch wichtige Punkte

- Setzen Sie Blutverdünner nicht selbst ab.
- Offenlegung von Isotretinoin, Steroiden, Biologika und immunsuppressiver Behandlung.
- Aktive Fieberbläschen, Zahnabszesse, Hautinfektionen oder der Einsatz von Antibiotika sollten nicht verborgen bleiben.
- Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel und rezeptfreie Produkte gehören ebenfalls auf die Liste.

Sicherer Satz

Fragen Sie direkt: „Ändert dieses Medikament oder diese Erkrankung meinen Behandlungsplan?“

Warnschilder

Nutzen Sie unverzüglich den richtigen Kontaktweg.

Warnschilder

Nach der Behandlung sind die zentralen Fragen, ob sich die Symptome bessern, ob eine Seite deutlich verändert ist und ob allgemeine Gesundheitssymptome vorhanden sind.

Entscheidungstabelle

Beobachten Sie zu Hause Leichte Rötung, punktuelle Schwellung oder bessernde Schmerzen.

Rufen Sie die Klinik an Unerwartete Asymmetrie, Schwere/Herabhängen des Augenlids, zunehmende Blutergüsse oder starke Kopfschmerzen.

Notfallversorgung Schluck-/Atembeschwerden, allgemeine Schwäche, Sprachveränderung oder schwere allergische Reaktion.

Klinisch wichtige Punkte

- Eine leichte Verbesserung der Symptome ist normalerweise beruhigender.
- Zunehmende Schmerzen oder eine rasche Verschlechterung sollten beurteilt werden.
- Fotos können helfen; Sie ersetzen keine Prüfung.
- Schwerwiegende Symptome sollten nicht nur auf Nachrichtenantworten warten.

Dringende Warnung

Suchen Sie bei Schluckbeschwerden, Atembeschwerden, allgemeiner Muskelschwäche, Sprachveränderungen, Doppelbildern oder schweren allergischen Reaktionen einen Notarzt auf.

Beim Senden von Fotos

Senden Sie Fotos mit der Zeit seit der Behandlung, dem Schmerzscore und ob sich das Symptom verschlimmert.

Foto- und Follow-up-Richtlinie

Fotos unterstützen die Nachverfolgung; Sie ersetzen nicht die Diagnose.

Foto und Follow-up

Photos are useful for baseline and follow-up comparison.

Licht, Blickwinkel, Ausdruck, Linse, Make-up und Schwellung können die Interpretation verändern.

Entscheidungstabelle

Gutes Folgefoto

Mehrere Winkel, gleichmäßiges Licht, kein Filter, mit Eingriffsdatum und Symptomzeitpunkt.

Irreführendes Foto

Gefiltert, unterschiedliche Beleuchtung, zu nah, mit Make-up bedeckt oder unterschiedliche Linse.

-Grenze

Fotos ersetzen keine Berührung, Temperatur, Schmerz, Durchblutung oder neurologische Beurteilung.

Klinisch wichtige Punkte

- Verwenden Sie das gleiche Licht, den gleichen Winkel, den gleichen Abstand und keine Filter.
- Fotos von Nahsymptomen und Fotos allgemeiner Bereiche dienen unterschiedlichen Zwecken.
- Sehvermögen, Atmung, neurologische Symptome oder schwere Infektionen sollten nicht auf Fotos warten.
- Remote-Überprüfung kann in manchen Fällen hilfreich sein; sie ersetzt keine Prüfung.

Folgeformat

Geben Sie beim Senden von Fotos Datum, Zeit seit der Behandlung, Schmerzbewertung und Symptomtrend an.

Druckbare Patientencheckliste

Eine praktische einseitige Zusammenfassung vor dem Termin.

Druckbare Checkliste

Diese Checkliste reduziert fehlende Details während der Konsultation. Speichern oder drucken Sie es vor dem Termin ab.

Entscheidungstabelle

Bringen

Medikamentenliste, Termine früherer Eingriffe, Allergie- und Gesundheitshinweise.

Vor der Abreise

Normale Symptome, Warnzeichen, Nachsorge und Zeitpunkt der Nachsorge.

Notfall

Schwerwiegende Symptome erfordern zusätzlich zum Klinikkontakt eine Notfallversorgung.

Zum Termin bringen

Bewahren Sie diese Seite im PDF auf oder drucken Sie sie vor der Konsultation aus.

Quellen und Klinikkontakt

Referenzen unterstützen Transparenz, keine Ergebnisversprechen.

Quellen

Dieser Leitfaden wurde unter Verwendung behördlicher Sicherheitsinformationen, klinischer Literatur, Patientensicherheitsgrundsätzen und FDA Botulinumtoxin-Warnhinweisen, Nichtaustauschbarkeit von Toxineinheiten und Patienteninformationsstandards erstellt.

Entscheidungstabelle

FDA/DailyMed Etikett dailymed.nlm.nih.gov – Verschreibungsinformationen für BOTOX Cosmetic, Warnhinweis, überarbeitet 10/2024.

Boxed-Warnungsfokus Fernausbreitung der Toxinwirkung; Schluck-, Sprach- oder Atembeschwerden müssen möglicherweise dringend untersucht werden.

Gerätesicherheit Botulinumtoxin Produkteinheiten gelten nicht als austauschbar.

Patientenfrage Klären Sie das Muskelziel, die Dosierungslogik, den Überprüfungszeitpunkt und dringende Warnzeichen.

Klinik Dr. Hamza Gemicı - Ataşehir, Istanbul.

Klinisch wichtige Punkte

- Quellen unterstützen den Sicherheitsrahmen dieses Leitfadens; Persönliche Indikationsentscheidungen erfordern eine persönliche Beurteilung.
- Offizielle Produkt-/Gerätewarnungen sollten bei der Einwilligung und Patientenaufklärung besprochen werden.
- Wenn eine Komplikation vermutet wird, verwenden Sie die Klinik- oder Notfallversorgungsrouten und nicht die Suchergebnisse.
- Dieses PDF enthält keine veröffentlichten Kostenvoranschläge, Ergebnisversprechen, Ferndiagnosen oder einen personalisierten Behandlungsplan.

Schlussbemerkung

Botox / Botulinumtoxin sollte für den richtigen Patienten mit der richtigen Erwartung und dem richtigen Nachsorgeplan in Betracht gezogen werden. Persönliche Entscheidungen erfordern eine persönliche ärztliche Beurteilung.