

Guide patient du microneedling RF

Avant - Jour du traitement - Suivi

Document éducatif général - ne remplace pas une évaluation médicale en personne.



Dr. Hamza Gemici

Médecin en esthétique médicale - Ataşehir, Istanbul

Médecine esthétique non chirurgicale axée sur la sécurité des patients

juin 2026 - Français

Sommaire

Sections

- **03. Comment utiliser ce guide**
Commencer
- **04. Le microneedling RF en un coup d'œil**
Résumé
- **05. Ce qu'il peut et ne peut pas faire**
Limites
- **06. Qui peut être un bon candidat ?**
Adéquation
- **07. Quand faut-il reporter le traitement ?**
Reporter
- **08. Que faut-il clarifier en premier ?**
Consultation
- **09. Préparation 4-2 semaines avant**
4-2 semaines
- **10. Dernières 48 heures et matinée de traitement**
Dernières 48 heures
- **11. Déroulement du jour de traitement**
Jour du traitement
- **12. Qu'est-ce que ça fait ?**
Confort
- **13. Qu'est-ce qui est normal juste après ?**
Premières heures
- **14. Suivi de la première semaine**
Première semaine
- **15. Quand les résultats sont-ils évalués ?**
Résultats
- **16. Médicaments, infections et risques particuliers**
Médicament
- **17. Signes d'alerte**
Signes d'alerte
- **18. Politique de photo et de suivi**
Photo et suivi
- **19. Liste de contrôle patient à imprimer**
Liste de contrôle à imprimer
- **20. Sources et contact de la clinique**
Sources

Comment utiliser ce guide

Préparez-vous à la consultation et posez des questions plus sûres.

Commencer

Ce guide aide les patients envisageant le microneedling RF à comprendre la préparation, le jour de l'intervention, le suivi et les symptômes qui devraient déclencher un contact rapide.

Points cliniquement importants

- Les informations sont éducatives et ne remplacent pas la prise de décision médicale personnelle.
- Apportez vos médicaments, vos problèmes de santé, vos allergies, vos interventions esthétiques antérieures et vos attentes.
- L'objectif n'est pas une promesse de résultat ; il s'agit d'une planification plus claire de l'adéquation, des risques et du suivi.
- En cas de doute, contactez la clinique au lieu de vous fier aux commentaires sur les réseaux sociaux.

Meilleure utilisation

Lisez le guide complet avant la consultation, marquez les éléments de risque pertinents et posez ces questions directement.

Le microneedling RF en un coup d'œil

Définition courte, objectif réaliste et limites clés.

Résumé

Le microneedling RF est une procédure médico-esthétique prise en compte pour la texture de la peau, l'apparence des pores, les cicatrices d'acné, les ridules et les objectifs de fermeté cutanée. Le plan dépend d'une évaluation en personne et d'un examen des risques individuels.

Tableau décisionnel

But Stimulation cutanée contrôlée pour la qualité de la peau, sa texture, l'apparence des cicatrices d'acné, les pores et les ridules.

Pas un objectif Lifting chirurgical, dégraissage, peau impeccable en une seule séance ou effacement de tout souci de pigmentation.

Timing Rougeur et douleur ou sensibilité dans les premiers jours ; réponse de la qualité de la peau au fil des semaines ; examen plus significatif souvent à 6-12 semaines.

Principe de base Une charge de traitement plus lourde ne signifie pas un meilleur résultat ; l'indication correcte vient en premier.

Points cliniquement importants

- Une bonne indication compte plus qu'un nom de produit ou d'appareil.
- Les effets varient selon les patients ; les tissus, l'âge, le mode de vie et les antécédents médicaux sont importants.
- La même procédure n'est pas planifiée de manière identique pour chaque patient.
- Le traitement doit suivre un examen, un consentement éclairé et un plan de suivi.

Phrase de décision principale

Demandez : « Mes attentes sont-elles réalistes avec le microneedling RF ? »

Ce qu'il peut et ne peut pas faire

Connaître les limites fait partie de la sécurité des patients.

Limites

Le microneedling RF peut être la bonne option pour certains objectifs, mais ce n'est pas la réponse à toutes les préoccupations esthétiques. Des limites claires réduisent les risques inutiles liés au traitement.

Tableau décisionnel

Objectif plus adapté Stimulation cutanée contrôlée pour la qualité de la peau, sa texture, l'apparence des cicatrices d'acné, les pores et les ridules.

Attente irréaliste Lifting chirurgical, dégraissage, peau impeccable en une seule séance ou effacement de tout souci de pigmentation.

Peut avoir besoin d'une combinaison Volume, activité musculaire, qualité de la peau, pigmentation ou relâchement peuvent nécessiter des plans différents.

Points cliniquement importants

- L'anatomie initiale et la qualité des tissus affectent fortement le résultat.
- Les photos filtrées ou le résultat d'un autre patient ne doivent pas définir votre cible.
- Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une seule procédure résolve tous les problèmes du visage ou de la peau.
- Un report ou une recommandation différente peut constituer un bon jugement médical.

Vérification des attentes

Choisissez une préoccupation principale avant la consultation. Si l'objectif principal n'est pas clair, le plan le sera également.

Qui peut être un bon candidat ?

L'adéquation dépend de l'examen, pas seulement de l'âge.

Adéquation

Les patients présentant des problèmes de texture, de cicatrices d'acné, de pores, de ridules ou de fermeté, sans infection active et avec des attentes réalistes d'amélioration progressive peuvent être de meilleurs candidats.

Tableau décisionnel

Meilleur profil

Les patients présentant des problèmes de texture, de cicatrices d'acné, de pores, de ridules ou de fermeté, sans infection active et avec des attentes réalistes

Profil plus prudent

Sensibilité élevée, maladie cutanée active, maladie incontrôlée ou pression due à un événement majeur.

Règle d'évaluation

Les photos peuvent aider au tri ; l'adéquation nécessite une évaluation médicale en personne.

Points cliniquement importants

- Les attentes doivent être naturelles et mesurées.
- Une infection active, une maladie incontrôlée ou des objectifs irréalistes peuvent retarder le traitement.
- L'historique des procédures antérieures et des complications ne doit pas être caché.
- Un suivi accessible fait partie de la sécurité du traitement.

Préparation à la consultation

Apportez au rendez-vous votre principale préoccupation, le calendrier du traitement et tout historique de complications antérieures.

Quand faut-il reporter le traitement ?

Parfois, ne pas traiter aujourd'hui est la décision médicale la plus sûre.

Reporter

Le microneedling RF peut être reporté en cas d'infection active, de plaies ouvertes, de maladie incontrôlée, de grossesse/allaitement ou de nouveaux problèmes dans la zone de traitement. Une infection active par l'acné, un bouton de fièvre, une plaie ouverte, une procédure agressive récente, une barrière faible ou un risque de cicatrice/pigment plus élevé nécessitent un examen attentif.

Tableau décisionnel

Reporter aujourd'hui	Fièvre, infection active, plaie ouverte, bouton de fièvre, irritation évidente ou malaise.
Re-planifier avec le médecin	Grossesse/allaitement, anticoagulants, immunosuppression, implants ou intervention chirurgicale récente.
Envisagez un autre itinéraire	Attentes hors du cadre de l'intervention, forte pression extérieure ou besoin d'une autre spécialité.

Points cliniquement importants

- Signalez la fièvre, les boutons de fièvre actifs, les infections cutanées ou les plaies ouvertes avant votre arrivée.
- Divulguer les anticoagulants, les traitements immunosuppresseurs et les antécédents d'allergies graves.
- Des travaux dentaires récents, une intervention chirurgicale ou une autre procédure esthétique peuvent modifier le calendrier.
- Le report est une décision de sécurité et non un échec.

Avertissement urgent

Recherchez des soins médicaux d'urgence en cas de difficultés respiratoires, de réactions allergiques généralisées, de symptômes neurologiques, de changements de vision ou d'une aggravation rapide d'une infection.

Règle de sécurité

Arriver à un rendez-vous ne signifie pas que le traitement doit avoir lieu. Le dernier contrôle de sécurité vous protège.

Que faut-il clarifier en premier ?

Un bon plan est compréhensible avant le traitement.

Consultation

La consultation doit couvrir les attentes, les antécédents médicaux, les médicaments, les allergies, les procédures antérieures, la photographie, les risques, les alternatives et la planification du suivi.

Tableau décisionnel

Partages de patients

Attentes, procédures antérieures, médicaments, conditions, dates de voyage et d'événement.

Le médecin évalue

Adéquation, risques, alternatives, limites de traitement et plan de suivi.

Décision commune

Traitement, report, plan combiné ou référence.

Note de consultation

Si le plan n'est pas clair, vous n'êtes pas obligé de décider le jour même. Demandez des explications.

Préparation 4-2 semaines avant

Continuez à planifier de manière calme et prévisible.

4-2 semaines

Les semaines précédant le traitement doivent maintenir la peau et l'état de santé général stables, réduire les changements inattendus de médicaments ou de procédures et clarifier l'accès au suivi.

Points cliniquement importants

- Ne commencez pas de nouveaux soins de la peau puissants ou des traitements à domicile agressifs.
- Signalez un coup de soleil, une infection ou une irritation.
- Partagez les dates d'autres procédures esthétiques.
- Évitez de planifier immédiatement avant les événements majeurs.

Note de planification

Pour un premier traitement, laissez une marge raisonnable avant les événements importants.

Dernières 48 heures et matinée de traitement

Une préparation simple améliore le suivi.

Dernières 48 heures

Les deux derniers jours sont consacrés à une peau apaisée, à une communication claire sur la santé et à éviter une journée de traitement précipitée.

Tableau décisionnel

Faire

Soins simples, sommeil suffisant, communication ouverte.

Éviter

Nouveaux actifs, soleil intense, alcool/épuisement et arrêt autonome des médicaments.

Rapport

Fièvre, bouton de fièvre, infection, nouveau médicament, soins dentaires ou réaction cutanée.

Vérification finale

Si vous ne vous sentez pas bien le matin du traitement, contactez la clinique avant votre arrivée.

Déroulement du jour de traitement

Identité, consentement, plan, étapes de traitement et éducation post-cure.

Jour du traitement

La journée de procédure pour le microneedling RF comprend une brève mise à jour sur l'état de santé, un examen de la zone, une photographie/marquage si nécessaire, un consentement éclairé, des étapes de traitement et des instructions de suivi.

Points cliniquement importants

- Le plan peut changer pour des raisons de sécurité ou de confort.
- Signalez toute douleur, brûlure, étourdissement ou tout symptôme inhabituel pendant le traitement.
- Les symptômes normaux et les signes avant-coureurs doivent être clairs avant de quitter la clinique.
- Le suivi et l'itinéraire de contact doivent être clairement compris.

Pendant la procédure

N'essayez pas de prouver votre endurance ; signaler immédiatement une sensation ingérable.

Qu'est-ce que ça fait ?

Une absence totale de sensation n'est pas à attendre; le confort doit rester gérable.

Confort

Le microneedling RF peut donner l'impression de picotements, de chaleur, de pression et de courtes sensations de brûlure ; L'anesthésie topique et les pauses peuvent améliorer le confort.

Tableau décisionnel

On peut s'attendre Le microneedling RF peut donner l'impression de picotements, de chaleur, de pression et de courtes sensations de brûlure ; L'anesthésie topique et les

Parlez immédiatement Douleur aiguë, croissante et ingérable ; brûlant; vertiges; symptômes visuels ou respiratoires.

Mauvaise cible Plus d'inconfort ne signifie pas un meilleur résultat.

Points cliniquement importants

- La sensibilité varie selon les patients et les régions.
- Une communication ouverte améliore le confort et la sécurité.
- Une douleur intense ou croissante ne doit pas être considérée comme normale.
- La douleur ou la sensibilité post-procédure devrait généralement diminuer.

Échelle de confort

Évaluez la sensation de 0 à 10. Si elle devient ingérable, informez-en immédiatement le médecin.

Qu'est-ce qui est normal juste après ?

La première apparition n'est pas le résultat final.

Premières heures

Des rougeurs, de la chaleur, un léger gonflement, des croûtes localisées, une sécheresse et une sensibilité au toucher peuvent survenir après le traitement et devraient diminuer.

Tableau décisionnel

Observer à la maison	Symptômes légers et s'améliorant qui n'affectent pas l'état de santé général.
Appelez la clinique	Douleur croissante, gonflement marqué, changement de couleur, aggravation ou asymétrie inattendue.
Soins d'urgence	douleur qui augmente rapidement, rougeur généralisée, pus, fièvre, cloques, changements ressemblant à une brûlure ou réaction allergique grave

Points cliniquement importants

- Ne stressez pas la zone traitée le premier jour.
- Évitez la chaleur excessive, les exercices intenses et les massages inutiles.
- N'ajoutez pas de produits ou de médicaments puissants, sauf avis contraire.
- Si un symptôme s'aggrave, ne présumez pas qu'il est normal.

Avertissement urgent

Consultez rapidement un médecin si vous développez : une augmentation rapide de la douleur, une rougeur généralisée, du pus, de la fièvre, des cloques, un changement ressemblant à une brûlure ou une réaction allergique grave.

Forfait le jour même

Photographiez les symptômes inattendus sous un éclairage constant et enregistrez l'heure de début et la gravité.

Suivi de la première semaine

Des soins appropriés valent mieux qu'une intervention excessive.

Première semaine

La première semaine vise à maintenir le calme de la zone traitée, à confirmer que les symptômes s'améliorent et à signaler rapidement les changements.

Tableau décisionnel

0-24 heures

Soin calme et évitant les excès de chaleur.

2-3 jours

La douleur ou la sensibilité devraient diminuer ; une aggravation est signalée.

1 semaine

La zone devrait être plus calme ; les soins actifs de la peau reviennent selon un plan personnel.

Note de suivi

Tenez un journal des symptômes : heure de début, zone, gravité, tendance et symptômes associés.

Quand les résultats sont-ils évalués ?

Les premières impressions et les résultats matures sont différents.

Résultats

La rougeur superficielle s'améliore rapidement ; la texture, l'apparence et la fermeté de la cicatrice sont évaluées au fil des semaines. La réponse du collagène est progressive, donc un jugement le jour même est trompeur.

Points cliniquement importants

- Utilisez la même lumière et le même angle pour la comparaison des photos.
- Le changement de poids, le sommeil, le soleil, le tabac et les soins de la peau peuvent affecter l'apparence.
- Les premières améliorations ne sont pas définitives ; un changement subtil et précoce n'est pas un échec automatique.
- La répétition du traitement doit dépendre de l'évaluation et de la réponse, et non d'un seul calendrier.
- Le suivi doit combiner des photos standardisées, les résultats de l'examen et l'objectif initial du traitement.

Évaluation correcte

Jugez les résultats à l'aide de l'objectif initial, d'un examen de suivi et de photos standardisées, et non d'un selfie sous une lumière différente.

Médicaments, infections et risques particuliers

De petits détails peuvent changer le plan.

Médicament

Étant donné que le microneedling RF crée des microcanaux, le risque d'infection, l'utilisation d'isotrétinoïne, l'immunosuppression, les antécédents de feux sauvages et la tendance à la pigmentation sont particulièrement importants.

Tableau décisionnel

Isotrétinoïne/rétinoïde	La sécheresse, la sensibilité et l'état de barrière sont examinés ; le traitement peut être reporté.
Antécédents de boutons de fièvre	Une stratégie préventive peut être discutée pour le traitement du visage ou des lèvres.
Immunosuppression	Le risque d'infection et le plan de suivi nécessitent des soins supplémentaires.
Tendance pigmentaire	Le teint, l'historique solaire et la protection solaire stricte sont importants.

Points cliniquement importants

- N'arrêtez pas vous-même les anticoagulants.
- Divulguer l'isotrétinoïne, les stéroïdes, les produits biologiques et les traitements immunosuppresseurs.
- Les boutons de fièvre actifs, les abcès dentaires, les infections cutanées ou l'utilisation d'antibiotiques ne doivent pas être cachés.
- Les suppléments à base de plantes et les produits en vente libre font également partie de la liste.

Peine sûre

Demandez directement : « Ce médicament ou cette affection modifie-t-il mon plan d'intervention ? »

Signes d'alerte

Utilisez sans tarder la bonne voie de contact.

Signes d'alerte

Après le traitement, les questions clés sont de savoir si les symptômes s'améliorent, si un côté est clairement différent et si des symptômes généraux de santé sont présents.

Tableau décisionnel

Observer à la maison	Légère rougeur, sécheresse, croûtes localisées et amélioration de la sensibilité.
Appelez la clinique	Douleur croissante, rougeur étendue, aggravation des croûtes, gonflement ou drainage inattendu.
Soins d'urgence	Fièvre accompagnée d'une aggravation de l'infection, d'une réaction allergique généralisée, d'une sensation de brûlure ou d'une augmentation rapide de la douleur.

Points cliniquement importants

- Les symptômes qui s'améliorent légèrement sont généralement plus rassurants.
- Une douleur croissante ou une aggravation rapide doivent être évaluées.
- Les photos peuvent aider ; ils ne remplacent pas l'examen.
- Les symptômes graves ne doivent pas attendre uniquement les réponses aux messages.

Avertissement urgent

Recherchez des soins d'urgence en cas de douleur qui augmente rapidement, de rougeur qui se propage, de pus, de fièvre, de cloques, de changements ressemblant à une brûlure ou d'une réaction allergique grave.

Lors de l'envoi de photos

Envoyez des photos avec le temps écoulé depuis le traitement, le score de douleur et si le symptôme s'aggrave.

Politique de photo et de suivi

Photos supportant le suivi ; ils ne remplacent pas le diagnostic.

Photo et suivi

Les photos sont utiles pour la comparaison de référence et de suivi. La lumière, l'angle, l'expression, la lentille, le maquillage et le gonflement peuvent tous changer l'interprétation.

Tableau décisionnel

Bonne photo de suivi Plusieurs angles, lumière constante, sans filtre, avec date de procédure et timing des symptômes.

Photo trompeuse Filtré, éclairage différent, trop proche, maquillé ou objectif différent.

Limite Les photos ne remplacent pas le toucher, la température, la douleur, la circulation ou l'évaluation neurologique.

Points cliniquement importants

- Utilisez la même lumière, le même angle, une distance similaire et aucun filtre.
- Les photos rapprochées des symptômes et les photos de la zone générale ont des objectifs différents.
- La vision, la respiration, les symptômes neurologiques ou une infection grave ne doivent pas attendre les photos.
- L'examen à distance peut s'avérer utile dans certains cas ; il ne remplace pas l'examen.

Format de suivi

Lorsque vous envoyez des photos, indiquez la date, l'heure depuis le traitement, le score de douleur et l'évolution des symptômes.

Liste de contrôle patient à imprimer

Un résumé pratique d'une page avant le rendez-vous.

Liste de contrôle à imprimer

Cette liste de contrôle réduit les détails manqués lors de la consultation. Enregistrez-le ou imprimez-le avant le rendez-vous.

Tableau décisionnel

Apporter

Liste des médicaments, dates des procédures antérieures, notes d'allergie et de santé.

Avant de partir

Symptômes normaux, signes avant-coureurs, suivi et calendrier de suivi.

Urgence

Les symptômes graves nécessitent des soins d'urgence en plus du contact avec la clinique.

Apporter au rendez-vous

Conservez cette page au format PDF ou imprimez-la avant consultation.

Sources et contact de la clinique

Les références soutiennent la transparence, pas les promesses de résultats.

Sources

Ce guide a été préparé à partir des informations réglementaires sur la sécurité, de la littérature clinique, des principes de sécurité des patients et de la communication sur la sécurité du microneedling FDA RF, des complications liées aux appareils énergétiques et de la sécurité de la barrière cutanée.

Tableau décisionnel

FDA RF micro-aiguilletage

fda.gov - Risques potentiels liés à certaines utilisations de la radiofréquence (RF) Microneedling.

Appareils de microneedling FDA

fda.gov - Appareils de microneedling : risques courants et moins courants.

Focus sur le risque clinique

Les brûlures, les cicatrices, la perte de graisse, le changement de pigment, la réactivation de l'herpès, l'infection et les lésions nerveuses sont abordés

Question du patient

Renseignez-vous sur l'appareil, la profondeur de l'aiguille, l'approche énergétique, le risque lié au type de peau et le plan de suivi.

Clinique

Dr. Hamza Gemicı - Ataşehir, Istanbul.

Points cliniquement importants

- Les sources soutiennent le cadre de sécurité de ce guide ; les décisions relatives aux indications personnelles nécessitent une évaluation en personne.
- Les avertissements officiels relatifs aux produits/dispositifs doivent être discutés lors du consentement et de l'éducation du patient.
- Si une complication est suspectée, utilisez la clinique ou l'itinéraire de soins d'urgence plutôt que les résultats de recherche.
- Ce PDF ne fournit pas de devis publiés, de promesses de résultats, de diagnostic à distance ou de plan de traitement personnalisé.

Note finale

Le microneedling RF doit être envisagé pour le bon patient, avec les bonnes attentes et le bon plan de suivi. Les décisions personnelles nécessitent une évaluation médicale en personne.